



Entresto®
(sacubitril/valsartan) tablets

24/26mg • 49/51mg • 97/103mg

para la insuficiencia cardíaca



No son pacientes reales.

CON UN CORAZÓN MÁS SANO, PUEDE SEGUIR HACIENDO LO QUE MÁS LE GUSTA

ENTRESTO® es la marca ^{n.º}1 para la insuficiencia cardíaca prescrita por cardiólogos

¿Qué es ENTRESTO?

ENTRESTO es un medicamento de venta con receta que se usa para reducir el riesgo de muerte y hospitalización en adultos con insuficiencia cardíaca duradera (crónica). ENTRESTO funciona mejor cuando el corazón no puede bombear una cantidad normal de sangre al cuerpo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuál es la información más importante acerca de ENTRESTO que debo conocer?

ENTRESTO puede perjudicar la salud o causar la muerte de su bebé en gestación. Hable con su médico acerca de otras formas de tratar la insuficiencia cardíaca si planea quedar embarazada. Si queda embarazada durante el tratamiento con ENTRESTO, informe a su médico de inmediato.

Haga [clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA, y consulte los Datos importantes sobre ENTRESTO en las páginas 10 y 11.

EL TRATAMIENTO DE SU INSUFICIENCIA CARDÍACA PUEDE ABRIRLE UN MUNDO DE POSIBILIDADES

 **Entresto®**
(sacubitril/valsartan) tablets
24/26mg • 49/51mg • 97/103mg



No son pacientes reales.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No tome ENTRESTO si:

- es alérgico a cualquiera de los ingredientes de ENTRESTO.
- ha tenido una reacción alérgica, como hinchazón de la cara, los labios, la lengua, la garganta (angioedema) o dificultad para respirar mientras toma un tipo de medicamento llamado inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA) o bloqueador de los receptores de la angiotensina II (BRA).

Haga [clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA, y consulte los Datos importantes sobre ENTRESTO en las páginas 10 y 11.

SE COMPROBÓ QUE ES SUPERIOR EN AYUDAR A LAS PERSONAS A MANTENERSE VIVAS Y FUERA DEL HOSPITAL

En un estudio en el que los corazones de los pacientes estaban estirados y débiles, ENTRESTO® demostró ser superior en ayudar a las personas a mantenerse vivas y fuera del hospital frente a enalapril.

La insuficiencia cardíaca no es un evento único

Es una afección duradera (crónica) que puede empeorar con el tiempo. ENTRESTO® es la **marca n.º 1 para la insuficiencia cardíaca** prescrita por cardiólogos y ha ayudado a más de 1 millón de personas con insuficiencia cardíaca.

Pruebe un mes de ENTRESTO gratis para ver si es adecuado para usted*

*Disponible para todos los pacientes al comenzar el tratamiento, independientemente de la cobertura del seguro.

**No espere.
Pregúntele a su médico acerca de ENTRESTO.**

Obtenga más información en [ENTRESTO.com](https://www.entresto.com)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No tome ENTRESTO si (continuación):

- toma un medicamento inhibidor de la ECA. No tome ENTRESTO durante, al menos, 36 horas antes o después de tomar un medicamento inhibidor de la ECA. Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar ENTRESTO si no está seguro de si toma un medicamento inhibidor de la ECA.
- tiene diabetes y toma un medicamento que contiene aliskiren.

Haga [clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA, y consulte los Datos importantes sobre ENTRESTO en las páginas 10 y 11.

CÓMO FUNCIONA ENTRESTO®

 **Entresto®**
(sacubitril/valsartan) tablets
24/26mg · 49/51mg · 97/103mg


ENTRESTO es un medicamento diseñado específicamente para la insuficiencia cardíaca. Contiene 2 ingredientes activos que actúan de diferentes maneras.

Valsartán:

- Se ha utilizado durante años para tratar la insuficiencia cardíaca.
- Reduce el estrechamiento de los vasos sanguíneos y la acumulación de sodio y líquido.

Sacubitril:

- Funciona de manera distinta a cualquier otro tratamiento para la insuficiencia cardíaca y solo puede encontrarse en ENTRESTO.
- Ayuda a relajar los vasos sanguíneos y a disminuir el sodio y los líquidos en el cuerpo.



La insuficiencia cardíaca puede cambiar la estructura del corazón, por lo que es posible que no funcione tan bien.

ENTRESTO es el único medicamento para la insuficiencia cardíaca de su tipo. Ayuda a mejorar la capacidad del corazón para bombear sangre al cuerpo.

Haga [clic aquí](#) para ver cómo funciona ENTRESTO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Antes de tomar ENTRESTO, informe a su médico todas sus afecciones médicas, incluidas las siguientes:

- Tiene antecedentes de angioedema hereditario.
- Tiene problemas renales o hepáticos.
- Está embarazada o planea quedar embarazada; está amamantando o planea amamantar. Debe o bien tomar ENTRESTO o amamantar. No debe hacer ambas cosas.

Haga [clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA, y consulte los Datos importantes sobre ENTRESTO en las páginas 10 y 11.

CÓMO TOMAR ENTRESTO

Tome su dosis de ENTRESTO dos veces al día, exactamente como se le recetó. Su médico decidirá qué dosis es adecuada para usted.



Entresto®
(sacubitril/valsartan) tablets
24/26 mg • 49/51 mg • 97/103 mg



24/26 mg



49/51 mg



97/103 mg

Los comprimidos mostrados no son de tamaño real.

Puede tomar ENTRESTO con o sin alimentos.

Tome ENTRESTO a la misma hora todos los días para evitar omitir una dosis.

Si le recetaron ENTRESTO y actualmente toma un inhibidor de la ECA*:



**Deje de tomar su
inhibidor de la
ECA***



**Espere
36
horas**



**Comience a tomar
ENTRESTO, según se
le recetó**

*Como el enalapril o lisinopril.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Informe al médico acerca de todos los medicamentos que recibe, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. En particular, informe a su médico si toma suplementos con potasio o sustitutos de sal, fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), litio u otros medicamentos para la presión arterial alta o problemas cardíacos, como los inhibidores de la ECA, BRA o aliskiren.

Haga [clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA, y consulte los Datos importantes sobre ENTRESTO en las páginas 10 y 11.

CONOZCA LOS SÍNTOMAS DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA




Entresto®
(sacubitril/valsartan) tablets
24/26 mg • 49/51 mg • 97/103 mg

Algunos síntomas de la insuficiencia cardíaca pueden pasar desapercibidos o confundirse con signos normales de envejecimiento. Conocer la diferencia puede ayudarle a controlar mejor su afección.

Síntomas de la insuficiencia cardíaca a los que debe estar atento:



Falta de aire



Hinchazón



Sensación de cansancio o agotamiento



Tos



Confusión



Aumento rápido de peso

No son pacientes reales.

Haga un seguimiento de sus síntomas

Escriba sus síntomas todos los días y compártalos con su médico. Llame a su médico de inmediato si nota algún síntoma nuevo o si los síntomas anteriores han reaparecido o empeorado, ya que podrán resultar en una hospitalización por insuficiencia cardíaca.

Comience por usar el **Registro de síntomas** en la página 8.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ENTRESTO? ENTRESTO podría causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Hinchazón en la cara, los labios, la lengua y la garganta (angioedema), que puede provocar problemas para respirar o la muerte.** Solicite asistencia médica de emergencia inmediatamente si tiene síntomas de angioedema o dificultad para respirar. No tome ENTRESTO nuevamente si ha tenido angioedema al tomar ENTRESTO.
- Las personas de raza negra o que han tenido angioedema y toman ENTRESTO pueden tener un mayor riesgo de padecer angioedema.

Haga **clic aquí** para obtener la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA, y consulte los Datos importantes sobre ENTRESTO en las páginas 10 y 11.

CONSEJOS PARA AYUDARLE A CONTROLAR LA INSUFICIENCIA CARDÍACA



Entresto®
(sacubitril/valsartan) tablets
24/26mg • 49/51mg • 97/103mg

Además de sus medicamentos, tenga en cuenta que una dieta saludable y el ejercicio también son importantes para controlar la salud de su corazón.



Mantenga una dieta saludable para el corazón

Intente evitar los alimentos con alto contenido de sal, ya que demasiada cantidad puede empeorar la hinchazón.



Póngase en movimiento

Incluso un poco de actividad puede ayudar. Solo asegúrese de hablar primero con su médico sobre qué actividades son buenas para usted.



Pésese regularmente

Controle su peso todas las mañanas y anótelos en su Registro de síntomas. Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día, llame a su médico de inmediato.



Sea franco con su médico

Dígale qué es importante para usted. Les ayudará a elaborar el mejor plan de gestión para usted.

Comience por usar el **Registro de medicamentos** en la página 9.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ENTRESTO podría causar efectos secundarios graves, entre ellos (continuación):

- **Presión arterial baja (hipotensión)**, que podría ser más frecuente si toma diuréticos. Llame a su médico si se mareo o se siente mareado, o si siente extremo agotamiento.
- **problemas renales**
- **aumento de la cantidad de potasio en la sangre (hiperpotasemia).**

Los efectos secundarios más frecuentes fueron presión arterial baja, potasio elevado, tos, mareos y problemas de los riñones.

Le pedimos que informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración de alimentos y medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Haga **clic aquí** para obtener la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA, y consulte los Datos importantes sobre ENTRESTO en las páginas 10 y 11.

SEGUIMIENTO DE SÍNTOMAS

Registre sus síntomas todos los días.

Imprima más páginas o descargue una copia para llevarla a su próxima cita con el médico [aquí](#).



Entresto®
(sacubitril/valsartan) tablets
24/26mg • 49/51mg • 97/103mg

FECHA: _____

 PESO	Pésese todas las mañanas a la misma hora. Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día, llame a su médico de inmediato. _____ LIBRAS				
 SENSACIÓN DE CANSANCIO	NINGUNO	MEJOR	LO MISMO	PEOR	NUEVO
 HINCHAZÓN	NINGUNO	MEJOR	LO MISMO	PEOR	NUEVO
 TOS	NINGUNO	MEJOR	LO MISMO	PEOR	NUEVO
 FALTA DE AIRE	NINGUNO	MEJOR	LO MISMO	PEOR	NUEVO

FECHA: _____

 PESO	Pésese todas las mañanas a la misma hora. Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día, llame a su médico de inmediato. _____ LIBRAS				
 SENSACIÓN DE CANSANCIO	NINGUNO	MEJOR	LO MISMO	PEOR	NUEVO
 HINCHAZÓN	NINGUNO	MEJOR	LO MISMO	PEOR	NUEVO
 TOS	NINGUNO	MEJOR	LO MISMO	PEOR	NUEVO
 FALTA DE AIRE	NINGUNO	MEJOR	LO MISMO	PEOR	NUEVO

Haga [clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA, y consulte los Datos importantes sobre ENTRESTO en las páginas 10 y 11.

HAGA UN SEGUIMIENTO DE SUS TRATAMIENTOS



Entresto®
(sacubitril/valsartan) tablets
24/26mg • 49/51mg • 97/103mg

Es importante saber por qué se ha recetado cada medicamento, qué hace y cuándo tomarlo. Esto incluye productos de venta libre, vitaminas y suplementos alimenticios. Imprima todas las páginas que necesite para llevar a su próxima cita con el médico.

MEDICAMENTO _____ AFECCIÓN _____

DOSIS/FRECUENCIA _____

MÉDICO QUE LO RECETÓ _____ FECHA _____

MEDICAMENTO _____ AFECCIÓN _____

DOSIS/FRECUENCIA _____

MÉDICO QUE LO RECETÓ _____ FECHA _____

MEDICAMENTO _____ AFECCIÓN _____

DOSIS/FRECUENCIA _____

MÉDICO QUE LO RECETÓ _____ FECHA _____

MEDICAMENTO _____ AFECCIÓN _____

DOSIS/FRECUENCIA _____

MÉDICO QUE LO RECETÓ _____ FECHA _____

MEDICAMENTO _____ AFECCIÓN _____

DOSIS/FRECUENCIA _____

MÉDICO QUE LO RECETÓ _____ FECHA _____

Haga [clic aquí](#) para obtener la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA, y consulte los Datos importantes sobre ENTRESTO en las páginas 10 y 11.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE ENTRESTO®



Entresto®
(sacubitril/valsartan) tablets
24/26 mg • 49/51 mg • 97/103 mg

¿Cuál es la información más importante acerca de ENTRESTO que debo conocer?

ENTRESTO puede perjudicar la salud o causar la muerte de su bebé en gestación. Hable con su médico acerca de otras formas de tratar la insuficiencia cardíaca si planea quedar embarazada. Si queda embarazada durante el tratamiento con ENTRESTO, informe a su médico de inmediato.

¿QUÉ ES ENTRESTO?

ENTRESTO es un medicamento de venta con receta que se usa para reducir el riesgo de muerte y hospitalización en adultos con insuficiencia cardíaca duradera (crónica). ENTRESTO funciona mejor cuando el corazón no puede bombear una cantidad normal de sangre al cuerpo. También se usa para tratar a ciertos niños de 1 año de edad o más que tienen insuficiencia cardíaca sintomática.

Se desconoce si ENTRESTO es seguro y eficaz en pacientes menores de 1 año de edad.

No tome ENTRESTO si:

- es alérgico a cualquiera de los ingredientes de ENTRESTO.
- ha tenido una reacción alérgica que incluye hinchazón de la cara, los labios, la lengua, la garganta o dificultad para respirar mientras tomaba un tipo de medicamento llamado inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA) o bloqueador del receptor de la angiotensina II (BRA).
- toma un medicamento inhibidor de la ECA. **No tome ENTRESTO durante, al menos, 36 horas antes o después de tomar un medicamento inhibidor de la ECA.** Hable con su médico o farmacéutico antes de tomar ENTRESTO si no está seguro de si toma un medicamento inhibidor de la ECA.
- tiene diabetes y toma un medicamento que contiene aliskiren.

Antes de tomar ENTRESTO, infórmele a su médico todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente:

- Tiene antecedentes de angioedema hereditario.
- Tiene problemas renales o hepáticos.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Consulte "¿Cuál es la información más importante acerca de ENTRESTO que debo conocer?"
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si ENTRESTO pasa a la leche materna. Usted y su médico deben decidir si tomará ENTRESTO o amamantará. No debe hacer ambas cosas.

Informe al médico acerca de todos los medicamentos que recibe, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. El uso de ENTRESTO con otros medicamentos determinados puede hacer que estos se afecten entre sí. El uso de ENTRESTO con otros medicamentos puede causar efectos secundarios graves. Especialmente, informe a su médico si toma: suplementos con potasio o sustitutos de sal; fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE); litio u otros medicamentos para la presión arterial alta o problemas cardíacos, como los inhibidores de la ECA, BRA o aliskiren. Elabore una lista de sus medicamentos para mostrársela al médico y al farmacéutico cuando le den un medicamento nuevo.

Haga [clic aquí](#) para ver la Información completa de prescripción, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ENTRESTO® (continuación)



¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ENTRESTO? ENTRESTO podría causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- Consulte “¿Cuál es la información más importante acerca de ENTRESTO que debo conocer?”
- **Reacciones alérgicas graves que causan hinchazón del rostro, los labios, la lengua y la garganta (angioedema), que pueden provocar problemas para respirar y la muerte.** Solicite asistencia médica de emergencia inmediatamente si tiene síntomas de angioedema o dificultad para respirar. No tome ENTRESTO nuevamente si ha tenido angioedema durante el tratamiento con ENTRESTO.
- Las personas de raza negra que toman ENTRESTO pueden tener un mayor riesgo de tener angioedema que las personas que no son de raza negra y toman ENTRESTO.
- Las personas que han tenido angioedema antes de tomar ENTRESTO pueden tener un mayor riesgo de tener angioedema que las personas que no han tenido angioedema antes de tomar ENTRESTO. Consulte “¿Quiénes no deben tomar ENTRESTO?”
- Presión arterial baja (hipotensión). **La presión arterial baja podría ser más frecuente si también toma diuréticos. Llame a su médico si se mareo o se siente mareado o si siente extremo agotamiento.**
- **Problemas renales.** El médico controlará su función renal durante el tratamiento con ENTRESTO. Si tiene cambios en las pruebas de función renal, es posible que necesite una dosis más baja de ENTRESTO o dejar de tomar ENTRESTO durante un tiempo.
- **Aumento de la cantidad de potasio en la sangre (hiperpotasemia).** El médico le controlará el nivel de potasio en sangre durante el tratamiento con ENTRESTO.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ENTRESTO. Llame al médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

Los efectos secundarios más frecuentes fueron presión arterial baja, potasio elevado, tos, mareos y problemas de los riñones.

Le pedimos que informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración de alimentos y medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Esta información no es exhaustiva. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico, visite www.entresto.com para consultar la etiqueta del producto aprobada por la FDA o llame al 1-888-ENTRESTO.

Haga [clic aquí](#) para ver la Información completa de prescripción, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA.

ENTRESTO® OFRECE AHORROS Y APOYO DESDE EL PRINCIPIO

Enspire
PROGRAM
from Entresto®
SUPPORT DESIGNED WITH YOU IN MIND

Nos comprometemos a ayudar a que ENTRESTO sea más asequible para todos; está cubierto por la mayoría de los planes de seguro y tiene el copago de marca más bajo para más del 99 % de las personas con Medicare.^{1*}

Pruebe un mes de ENTRESTO gratis para ver si es adecuado para usted †‡

Surta sus medicamentos prescritos tan solo \$10[‡]

Para pacientes elegibles con seguro comercial.[§]
Pague tan solo \$10 por un suministro para 30, 60 o 90 días.

El **programa ENSPIRE de ENTRESTO®** ofrece apoyo diseñado pensando en usted. Proporciona consejos y herramientas que pueden ayudarlo durante el tratamiento. **Usted puede:**

- mejorar su dieta con recetas saludables, planes de comidas y guías prácticas, y obtener consejos y recursos sobre actividades.
- aprender a establecer un horario de medicamentos, obtener consejos para mantenerse encaminado y encontrar información sobre cómo otros pueden ayudar.

Visite [ENTRESTO.com/cost](https://www.entresto.com/cost) o llame al **1-888-ENTRESTO** para obtener más información sobre estilo de vida, tratamiento y apoyo financiero.

 facebook.com/entresto

 [entresto_sacubitril_valsartan](https://www.instagram.com/entresto_sacubitril_valsartan)

 [YouTube.com/LivingWithHF](https://www.youtube.com/LivingWithHF)

Haga clic aquí para obtener más información



Haga **clic aquí** para obtener la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA, y consulte los Datos importantes sobre ENTRESTO en las páginas 10 y 11.

^{*}Los costos de bolsillo variarán de un plan a otro. Consulte la información de cobertura de su plan para obtener más detalles.

[†]Disponible para todos los pacientes al comenzar el tratamiento, independientemente de la cobertura de seguro. Uno por paciente.

[‡]Se aplican limitaciones. Consulte los Términos y condiciones en [ENTRESTO.com/cost](https://www.entresto.com/cost).

[§]Oferta no válida bajo Medicare, Medicaid o cualquier otro programa federal o estatal.

Referencia: 1. Datos en archivo. Novartis Pharmaceuticals Corp; 2021.

ENTRESTO y el logotipo de ENTRESTO son marcas comerciales registradas de Novartis AG.



Novartis Pharmaceuticals Corporation
East Hanover, Nueva Jersey 07936-1080

© 2023 Novartis

12/23

316841